

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

19 MAI 1982

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR et CORSE

(ALPES de HAUTE PROVENCE, HAUTES-ALPES, ALPES MARITIMES, BOUCHES-DU-RHONE, HAUTE-CORSE, CORSE SUD, VAR, VAUCLUSE, SUD de la DROME)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Siège de la circonscription : 24, Rue Edouard Delanglade - 13006 MARSEILLE

Station d'Alertes : Quartier Cantarel - MONTFAVET Adresse Postale : B.P. 95 84140 MONTFAVET - TELEPHONE : (90) 88.21.83
ABONNEMENT ANNUEL : 85 F REGISSEUR DE RECETTES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE AVIGNON CCP MARSEILLE 9660 74 V

SPECIAL CORSE N° 5

VIGNE

MILDIOU -

Aucun foyer primaire n'ayant jusqu'à présent été découvert en Corse, le démarrage de la lutte peut encore être retardé de quelques jours.

A l'approche de la floraison, les grappes vont cependant devenir très sensibles aux attaques de Mildiou, en conséquence, nous conseillons en toutes situations de réaliser un traitement anti-mildiou avant le début de la floraison, soit normalement avant la fin Mai.

OIDIUM -

Cette maladie demeure préoccupante. Joindre un anti-Oïdium à la bouillie anti-Mildiou.

TORDEUSES DE LA GRAPPE -

Le vol de première génération touche à sa fin et dans l'ensemble peu de pontes ont été déposées. Une intervention avec des produits préventifs ne se justifie donc pas.

Nous recommandons d'attendre la formation des glomérules (plusieurs boutons floraux agglomérés par des fils soyeux secrétés par la chenille) pour décider de l'opportunité d'un traitement avec des produits curatifs.

Les glomérules ne seront bien visibles qu'à partir de la fin Mai.

Notre prochain bulletin fera le point de la situation.

LECANINES (cochenilles) -

Les toutes premières sorties de larves sont constatées. Dans les parcelles où des foyers sont observés, prévoir une intervention vers la fin Mai début Juin avec métidathion (Ultracide), parathion (Nombreuses spécialités) ou méthomyl (Lannate).

Les foyers de cochenilles sont facilement décelables par la présence de fourmis et de fumagine sur les ceps contaminés.

.../...

P9

ARBRES FRUITIERS

PUCERONS -

Les premiers foyers commencent à se manifester sur pêchers, amandiers et poiriers.

Une intervention avec un aphicide systémique est à réaliser assez rapidement dans tous les vergers parasités.

Sur agrumes, il est encore trop tôt pour intervenir.

TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER -

Les captures de papillons sont depuis quelques jours nombreuses et les premières larves sont déjà écloses en Haute-Corse.

Intervenir dès à présent dans les vergers sensibles.

CARPOCAPSE DES POMMES -

Aucune intervention n'est à prévoir dans l'immédiat.

CULTURES MARAICHERES

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE -

Les premières taches sont observées en Marana depuis le 17 Mai.

Il conviendrait d'assurer rapidement la protection contre cette maladie avec, de préférence, un produit à action stoppante.

MILDIOU DE LA TOMATE -

Traiter également les plantations de tomates contre le Mildiou.

